β-羟丁酸 (β-HB) 含量检测试剂盒说明书

产品货号	产品名称	包装规格	测定方法
AYFC3-M48	β-羟丁酸 (β-HB) 含量检测试剂盒	48T	微量法
AYFC3-M96		96T	微量法

一、测定意义:

β-羟丁酸是酮体的主要成分,其测定在临床中具有重要意义,尤其在糖尿病酮症酸中毒(DKA)的早期诊断和病情监测中发挥关键作用。

二、测定原理:

β-羟丁酸在 β-羟丁酸脱氢酶的催化下脱氢生成乙酰乙酸。而辅酶I则被还原成为还原型辅酶I。生成的还原型辅酶I和 INT 在黄递酶的催化下生成 formazane(红色),据此可在 505nm 波长处测定吸光度的变化可计算出样本 β-羟丁酸的含量。

三、试剂组成:

试剂名称	试剂装量(48T)	试剂装量(96T)	保存条件
提取液	液体 60mL×1 瓶	液体 110mL×1 瓶	2-8°C保存
试剂一 A	液体 9mL×1 瓶	液体 18mL×1 瓶	2-8°C保存
试剂一 B	液体 1mL×1 瓶	液体 2mL×1 瓶	2-8°C保存
试剂一: 试剂一 A 和试剂二 B 按照 9:1 比例混合, 现用现配。			
试剂二	液体 6mL×1 瓶	液体 6mL×1 瓶	2-8°C保存
标准品	液体 0.2mL×1 瓶	液体 0.2mL×1 瓶	2-8°C保存

四、操作步骤:

样本前处理

- 1、组织: 按照组织质量(g):提取液体积(mL)为 1:5~10 的比例(建议称取 0.1g 组织,加入 1 mL 提取液)进行冰浴匀浆。5000 rpm, 4°C离心 10 min, 取上清置冰上待测。
- 2、血清(浆)等液体样本: 直接测定。若有浑浊请离心后取上清待测。

测定步骤

- 1、酶标仪预热 30min 以上, 调节波长至 505nm。
- 2、样本测定(96 孔板中依次加入下列试剂):

试剂 (μL)	空白管	标准管	测定管
上清液	-	-	5
标准管	-	5	-

蒸馏水	5	-	-
试剂一	150	150	150
混匀，置 37°C 孵育 5 分钟后，于 546nm 波长处读取吸光度 A1 _{空白} 、A1 _{标准} 和 A1 _{测定} 。计算 $\Delta A1_{测定} = A1_{测定} - A1_{空白}$ ， $\Delta A1_{标准} = A1_{标准} - A1_{空白}$ 。			
试剂二	50	50	50
混匀，置于 37°C 水浴锅/恒温培养箱反应 5min 后，于 505nm 波长处读取吸光度 A，分别记为 A2 _{空白} 、A2 _{标准} 和 A2 _{测定} ，计算 $\Delta A2_{测定} = A2_{测定} - A2_{空白}$ ， $\Delta A2_{标准} = A2_{标准} - A2_{空白}$ 。 $\Delta A_{测定} = \Delta A2_{测定} - \Delta A1_{测定}$ ， $\Delta A_{标准} = \Delta A2_{标准} - \Delta A1_{标准}$ 。(空白管和标准管只需测 1-2 次)。			

五、β-羟丁酸含量测定：

1、按样本蛋白浓度计算

$$\beta\text{-HB}(\mu\text{mol}/\text{mg prot}) = C_{标准} \times \Delta A_{测定} \div \Delta A_{标准} \div C_{pr}$$

2、按样本质量计算

$$\beta\text{-HB}(\mu\text{mol}/\text{g}) = C_{标准} \times \Delta A_{测定} \div \Delta A_{标准} \div W \times V_{样总}$$

3、血清（浆）等液体计算

$$\beta\text{-HB}(\mu\text{mol}/\text{mL}) = C_{标准} \times \Delta A_{测定} \div \Delta A_{标准}$$

C_{标准}:标准管浓度;

V_{样总}:提取液体积，1mL;

C_{pr}:样本蛋白质浓度，mg/mL;

W:样本质量，g;